


# FEITEN OVER STOTTEREN


THERAPIE IS MAATWERK



Stotteren is als een ijsberg. Een deel kun je horen en zien en een deel niet.



**STOTTEREN IS BIJ IEDEREEN ANDERS**



Bij een groot deel van de kinderen gaat stotteren over.



Stotteren komt voor in alle landen, culturen en talen.



ER STOTTEREN MEER MANNEN

4 mannen



1 vrouw



## AANLEG

En kind heeft een grotere kans op stotteren als het voorkomt in de familie.



## ONTSTAAN

Stotteren start meestal tussen het 2de en 5de levensjaar.



## ONTWIKKELING

Hoe langer het stotteren aanwezig is, hoe kleiner de kans dat het overgaat.



## BEHANDELEN

Vroeg behandelen zorgt voor een grote kans op herstel.

Zoek hulp bij een gespecialiseerd stottertherapeut. [www.rondomspraak.nl](http://www.rondomspraak.nl)

# FEITEN OVER STOTTERTHERAPIE

1

## TOT 6 JAAR

- De eerste 6-12 maanden houdt de therapeut het stotteren nauwkeurig in de gaten (monitoren).
- Behandeling start o.a. als het kind lijdt onder stotteren, ouders bezorgd zijn, het kind minder gaat spreken of het stotteren weinig tot niet afneemt.
- Er zijn twee onderbouwde behandelprogramma's: DCM en LP.
- De behandeling van stotteren begint voordat het kind 5 jaar is.
- Ouders en de therapeut werken nauw samen en kiezen welk programma het beste aansluit.

2

## 6 TOT 13 JAAR

- De kans op herstel wordt steeds kleiner, we raden aan te starten met de behandeling.
- De stottertherapeut doet onderzoek om de ernst én de belemmering in het dagelijks leven van het stotteren te bepalen.
- Er bestaan meerdere effectieve behandelprogramma's.
- De behandeling wordt afgestemd op wat de persoon nodig heeft.
- School en de omgeving worden betrokken bij de behandeling.

3

## 13 JAAR EN OUDER

- Elke behandeling start met een stotteronderzoek.
- Een goede therapie is: op maat gemaakt, behandelt het gehele probleem en werkt óók in het dagelijks leven.
- Minder stotteren, makkelijk spreken en alles durven zeggen wat je wilt, zijn haalbare doelen.
- Groepstherapie kan een aanvulling zijn op de individuele therapie.
- Als de behandeling stopt, wordt er een nazorgplan gemaakt.